



Uw kat weer thuis na operatie in onze praktijk

Uw kat mag na de operatie weer mee naar huis, maar heeft uiteraard speciale zorg nodig bij thuiskomst voor een goed herstel;



- Zorg van tevoren voor een rustig, warm plekje in huis zodat uw kat tot rust kan komen en warm blijft. Deze plek en/of omgeving kunt u eventueel inspraken met [Feliway](#), een rustgevend kattenferomoon.
- Katten kunnen na de operatie nerveus, ingetogen en gedesoriënteerd zijn. Praat zachtjes tegen uw kat en aai hem/haar voorzichtig.
- Pijn is moeilijk te herkennen, maar vaak stopt uw kat met eten of trekt zich terug.
- Uw kat heeft tijdens de operatie al een antibioticum- en/of pijnstillende injectie gekregen. Start daarom de volgende dag pas met de meegegeven medicatie.
- Volg de doseringen op het etiket en maak een eventuele antibioticumkuur helemaal af.
- Probeer te voorkomen dat uw kat aan de wond of hechtingen likt of bijt. Eventueel is er bij ons een plastic kraag of medical pet-shirt (rompertje) te verkrijgen.
- Probeer springen en spelen te voorkomen, dit kan nadelig zijn voor de wondgenezing.
- Laat uw kat pas naar buiten als hij/zij volledig hersteld is, dus ook goed eet en drinkt.
- Soms ontstaat een kleine zwelling ter plaatse van de wond. Dit is in de meeste gevallen een reactie op onderhuids geplaatst hechtmateriaal en trekt geleidelijk weer weg.

Hoe geef ik mijn kat eten na de operatie?

De eerste 12 uur na de operatie hoeft u nog geen voedsel aan te bieden, wel drinken. U krijgt echter van ons een licht verteerbare herstelvoeding mee, waarmee u de eerste avond mag beginnen. Mocht uw kat nog wat misselijk zijn door de narcose, dan begint u pas de volgende ochtend met kleine porties van het meegegeven voer. Om uw kat aan te moedigen met eten en drinken kunt u het volgende proberen;

- Zacht voer kan worden opgewarmd, bijvoorbeeld met een scheutje lauw water.
- Indien uw kat weigert te eten, bied dan tijdelijk voer aan dat voor uw kat aantrekkelijk is, tot uw kat weer goed eet. Start pas daarna met het eventueel voorgeschreven dieet.
- Gebruik een ondiepe voerbak of schotel om te voorkomen dat de snorharen van uw kat de randen raken. Verwijder gedurende 1-2 dagen eventuele kattenbelletjes en penningen van de halsband. Het gevoel en het geluid kunnen bij een gestreste kat extra prikkeling geven.
- Een eventuele kraag kan tijdens het eten tijdelijk worden verwijderd.
- Bied meerdere keren per dag kleine maaltijden aan. Haal tussendoor het voerbakje weg.
- Probeer eventueel om uw kat uit uw hand te laten eten of smeer een beetje voer aan de pootjes. Uw kat gaat dit er af likken en krijgt soms zo de smaak te pakken.



Weer terug bij uw andere katten

Tijdens de operatie van uw kat in onze praktijk kan hij/zij een onbekende geur hebben gekregen. Deze geur, maar ook het instabiel bewegen door de narcose, kan ervoor zorgen dat de eventuele andere katten in huis argwanend of zelfs agressief reageren. Een rustige herintroductie is daarom belangrijk en gaat als volgt;



- Gebruik eventueel een **Feliway** verdamper en hang deze op voor uw kat terugkeert naar huis.
- Geef uw kat de tijd om weer zijn/haar eigen geur en manier van bewegen terug te krijgen. Indien nodig kunt u uw kat eventueel eerst een dag apart houden van uw andere katten.
- Herintroduceer uw kat alleen onder toezicht.
- Het kan verstandig zijn om bij thuiskomst het dekentje of de handdoek uit het mandje te wassen om de praktijkgeur kwijt te raken.

Als u ziet dat uw kat niet goed herstelt; geen roze tong, rode/gezwollen wond, suf/koud, braken/geen eetlust? Dan is er extra zorg nodig en dient u contact met ons op te nemen.

Controle na de operatie

Na 10 dagen zien wij uw kat graag terug voor controle van de wond en het verwijderen van eventueel hechtmateriaal.

Gecastreerde katers hebben na de operatie geen huidhechtingen. Uw kater hoeft alleen bij ons langs te komen voor controle als hij niet fit is of als er andere instructies zijn gegeven.

Indien u tegen problemen aanloopt of vragen heeft, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.